サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年2月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
移植水稲 直播水稲	-	一年生雑草	耕起20～10日前（雑草生育期）	400～600ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内	1回
麦類(小麦を除く)			耕起7日前まで（雑草生育期）					3回以内	2回以内
小麦			耕起前（雑草生育期）			2回以内			
			は種後出芽前（雑草生育期）						
		多年生雑草	耕起前（雑草生育期）	500～1000ml/10a					
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）						
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔		収穫14日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～600ml/10a					
水田作物(水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期			1回		1回	1回
		多年生雑草		500～2000ml/10a					
水田作物(水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20～10日前（雑草生育期）	400～600ml/10a				2回以内	
ｷｬﾍﾞﾂ			耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					1回	

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年2月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
だいこん	-	一年生雑草	耕起前又はは種7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～600ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内	1回
はくさい			耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					1回	
えだまめ			耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					3回以内	4回以内
たまねぎ(秋播移植栽培)			耕起又は定植7日前まで（雑草生育期）			3回以内			3回以内
たまねぎ(秋播移植栽培) ねぎ			定植後畦間処理：雑草生育期（但し、収穫30日前まで）						
ねぎ			耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）						

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年2月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
果樹類(かんきつ、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙを除く)	-	一年生及び多年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～1000ml/10a	100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
かんきつ								5回以内	
きく		一年生雑草	耕起前又は定植前まで（雑草生育期：草丈50cm以下）	400～600ml/10a		2回以内		2回以内	2回以内
だいず			耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					4回以内	4回以内
			は種後出芽前（雑草生育期：草丈30cm以下）						
			畦間処理：雑草生育期（草丈30cm以下）（但し、収穫前日まで）						

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法　　2019年2月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	ｽｷﾞﾅ	雑草生育期（草丈30cm以下）	1000～4000ml/10a	100L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
		一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）	500～1000ml/10a					
牧草	牧野・草地		更新・造成10日前まで（雑草生育期）	400～750ml/10a		1回	雑草茎葉散布		2回以内
茶	-		摘採7日前まで（雑草生育期）	400～600ml/10a				2回以内	

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

2019年2月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生雑草	草丈抑制による刈込軽減	雑草生育期又は刈取後再生期（但し、収穫14日前まで）	50～150ml/10a	100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	2回以内