

登録番号：第21766号

名称：ラウンドアップマックスロード

適用病害虫の範囲及び使用方法

登録日：2021年12月22日

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
果樹類 (かんきつを除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~500 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	3回以内	3回以内	3回以内		
		多年生雑草		500~1000 ml/10a	少量散布 25~50 L/10a					
		スギナ		1500~2000 ml/10a	25~50 L/10a					
		マルバツユクサ		500~1500 ml/10a	50~100 L/10a					
		一年生雑草		200~1000 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	5回以内				
		多年生 広葉雑草		500~1000 ml/10a	少量散布 5~50 L/10a					
		多年生 イネ科雑草		1500~2000 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a					
		スギナ		500~1500 ml/10a	少量散布 25~50 L/10a					
かんきつ	—	マルバツユクサ	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	3回以内		
		一年生雑草		500~1000 ml/10a	少量散布 5~50 L/10a	3回以内				
		多年生雑草		1500~2000 ml/10a	25~50 L/10a					
		スギナ		500~1500 ml/10a	50~100 L/10a					
		マルバツユクサ		500~1500 ml/10a	少量散布 25~50 L/10a					
びわ(葉)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~500 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	3回以内		
		多年生雑草		500~1000 ml/10a	少量散布 5~50 L/10a	3回以内				
		スギナ		1500~2000 ml/10a	25~50 L/10a					
		マルバツユクサ		500~1500 ml/10a	50~100 L/10a					
		一年生雑草		200~500 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回				
オリーブ (葉)	—	多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500~1000 ml/10a	少量散布 25~50 L/10a	3回以内	3回以内	3回以内		
		スギナ		1500 ml/10a	25~50 L/10a					
		マルバツユクサ		500~1500 ml/10a	50~100 L/10a					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釀水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a	3回以内	3回以内	
		一年生雑草及び多年生広葉雑草		500~1000 mL/10a				
		一年生雑草		200~500 mL/10a				
		多年生雑草		200~1000 mL/10a				
		スギナ		1500~2000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a			
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草		200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回	1回	
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	少量散布 5~50 L/10a			
		スギナ		1500~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
水田作物 (水稻を除く) 移植水稻	—	一年生雑草及び多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内	2回以内	
		多年生イネ科雑草		500 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a			
				200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
直播水稻	—	一年生雑草及び多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内
		多年生イネ科雑草		500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a			
		一年生及び多年生雑草		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
		一年生雑草	は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	200～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
		多年生雑草		200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
麦類	—	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	少量散布 5～25 L/10a	3回以内	3回以内	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
		一年生雑草及び多年生禾本科雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
	圃場内の周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
			とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
	—	一年生及び多年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	2回以内	2回以内	2回以内
			収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a			
			耕起前又は 出芽前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a			
	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	4回以内	4回以内	4回以内
			落葉終期～ 収穫14日前まで (雑草生育期)	500mL/10a	50～100 L/10a			
					1回			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
えだまめ 野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、アスパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、だいこん、トマト、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、なす、びわ(葉)、カーブ(葉)、たらのき、薬用にんじん、いも類、豆類(種実)を除く) はくさい キャベツ レタス	一年生雑草 —	耕起前又は出芽前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
			収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理)	通常散布 50~100 L/10a	少量散布 25~50 L/10a	2回以内						
		耕起前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a	1回	1回					
				通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a	雑草茎葉散布						
		耕起前又は定植5日前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a	少量散布 25~50 L/10a							
				通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a							
		収穫30日前まで(雑草生育期:定植後畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a	少量散布 25~50 L/10a	3回以内	3回以内					
				通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a							
		耕起5日前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a							
				通常散布 50~100 L/10a	少量散布 25~50 L/10a							
		スギナ	耕起又は定植14日前まで(スギナ生育期)	1500~2000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a							
			耕起5日前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	少量散布 5~50 L/10a						
		一年生雑草			通常散布 50~100 L/10a	少量散布 25~50 L/10a						
		収穫7日前まで(雑草生育期:畦間処理)	通常散布 50~100 L/10a		少量散布 25~50 L/10a							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
にんにく	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	1回	3回以内		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
アスパラガス	—	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	3回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			収穫 5 日前まで (雑草生育期： 畦間処理)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
だいこん	—	一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	2回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫 5 日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
薬用 にんじん	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	3回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
トマト しゃくやく (薬用) たらのき	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	2回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
きゅうり なす	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	3回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
ピーマン とうがらし類	—	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	2回以内	2回以内	10回以内 (1年間に 2回以内)		
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a					
			耕起前まで (雑草生育期)	1500～ 2000mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回				
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					
			スギナ		通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
いも類 (かんしょを除く)	—	一年生雑草	耕起前又は植付前まで(雑草生育期)	200～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	雜草茎葉散布	1回				
かんしょ			耕起前又は播種前まで(雑草生育期)			2回以内		2回以内				
茶			収穫 60 日前まで(雑草生育期 : 畦間処理)									
さとうきび		一年生及び多年生雑草	摘採 7 日前まで(雑草生育期)	500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a	4回以内		6回以内				
		一年生雑草	耕起前又は植付前まで(雑草生育期)			2回以内						
		多年生雑草	収穫 60 日前まで(雑草生育期 : 畦間処理) (但し、仮茎長 1.5m 以上)									
		一年生及び多年生雑草	収穫 60 日前まで(雑草生育期 : 畦間処理) (但し、仮茎長 1.5m 以上)			2回以内						
圃場内の周縁部	一年生雑草	収穫 60 日前まで(雑草生育期)	200～500 mL/10a	500～1000 mL/10a								
		多年生雑草										

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
飼料用とうもろこし	—	一年生及び多年生雑草	飼料用とうもろこし出芽前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内		
花き類・観葉植物(きくを除く)		一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
きく			雑草生育期 畦間処理	200~500 mL/10a 500~1000 mL/10a 1500~2000 mL/10a 500~1500 mL/10a 200~500 mL/10a 500~1000 mL/10a 1500~2000 mL/10a 1000~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	4回以内		4回以内		
樹木類		一年生雑草	雑草生育期		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
		多年生雑草			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a					
		スギナ			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
		マルバツユクサ			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	200~500 mL/10a 500~1000 mL/10a 1500~2000 mL/10a 1000~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~25 L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草木茎葉散布	3回以内		
		多年生雑草			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
		一年生及び多年生雑草			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
		スギナ			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
		スキ ヒレハリソウ クズ等のつる性 多年生雑草 ササ類 雜かん木			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a					
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び多年生雑草	耕起前まで(雑草生育期) 耕起整地後～は種当日まで(雑草発生抑制期)	200~500 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内		
		多年生 イネ科雑草	最終刈取後： 雑草生育期		500~1000 mL/10a	50~100 L/10a				
ソルガム		一年生雑草	耕起前又は は種前まで	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	2回以内		2回以内		
桑	—	一年生及び多年生雑草	発芽前又は 夏切後発芽前(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	4回以内		4回以内		
林木	林地 造林地 (地ごしらえ)	スキ、ササ類、 クズ等の 多年生雑草、 雜かん木	生育期	1000~2000 mL/10a	30L/10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内		
まつ (下刈り)		一年生雑草			25L/10a					
飼料用さとうきび	—	多年生雑草	耕起前又は 植付前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a 500~1000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内		

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釗倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	クズ 雜かん木 クズ・フジ等のつる類	生育期 雜かん木生育期 生育期	原液 原液 又は2倍液	1~2mL/株 1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下 2~3 10~15cm 4~6 16~20cm 7~9 20cm以上 10以上 <u>つる径</u> <u>使用量(mL/株)</u> 2.0cm以下 0.5 2.1~3.0cm 1.0 3.1~4.0cm 1.5 4.1~5.0cm 2.0 5.1cm以上 3.0以上		株頭注入処理 立木注入処理 つる注入処理	
林木	林地	雜かん木、間伐するすぎ、ひのき	雜かん木、間伐するすぎ、ひのき生育期	原液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下 2~3 10~15cm 4~6 16~20cm 7~9 20cm以上 10以上		立木注入処理	
	林地 放置竹林 畠地	アカギ	アカギ生育期	原液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10以上		竹稈注入処理	
畠作物	畠地	竹類	夏~秋期	原液	5~10mL/本			
		アカギ	アカギ生育期		1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 <u>地上30cm直径</u> <u>カ所数</u> 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10以上		立木注入処理	

塗布処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釀倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	雜かん木	伐採直後	原液 又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	—	植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理	—	
樹木類	林地、 畠地			原液	切り口直径 5cm以下	塗布量 2mL	4回以内	切株塗布 処理	4回以内
牧草	牧野、 草地				5~10cm	3~6mL	2回以内		3回以内
日本芝 (のしば)	—	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	5~10倍	10cm以上	10mL以上	3回以内	雑草茎葉塗布	3回以内