

クサトローゼ 適用表

野菜類ならびに、休耕田 適用拡大 (2021年11月24日付け)

作物名	適用場所	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤 の 使用 回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の総 使用回数			
				薬量	希釈水量						
かんきつ	—	一年生 雑草	収穫7日前 まで(雑草 生育期)	250mL/10a	100L/10a	3回 以内	雑草茎葉 散布	5回以内			
りんご なし				250～ 500mL/10a	50～ 100L/10a			3回以内			
小麦				500～ 1000mL/10a							
キャベツ		多年生 イネ科 雑草	耕起前まで (雑草生育 期)	250mL/10a	100L/10a	1回		1回			
たまねぎ				250～ 500mL/10a				3回以内			
野菜類(キ ヤベツ、た まねぎを除 く)				定植前まで (雑草生育 期)	250mL/10a	2回 以内		1回			
水田作物 (水田畦 畔)		多年生 雑草	耕起または 定植7日前 まで(雑草 生育期)	250～ 500mL/10a	50～ 100L/10a						
水田作物、 畑作物(休 耕田)				収穫14日 前まで(雑 草生育期)	500mL/10a						
樹木等		休耕田	一年生 及び多年生 広葉雑草	500～ 1000mL/10a	3回 以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3回以内				
		公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生 雑草	500mL/10a							
			多年生 雑草	1000mL/10a							
			ススキ、ササ 類	1000～ 2000mL/10a							
			スギナ	2000mL/10a				25～ 50L/10a			

作物名	適用 場所	適用 雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の 使用回 数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の総 使用回数
林木	林地、 放置竹林	竹類	夏～秋期	原液	5～15 mL/本	—	竹稈 注入処理	—